

La remolacha forrajera AMARILLA VAURIAC es una variedad de ciclo semi-precoz, especialmente valorada en la alimentación animal por su alto contenido energético y facilidad de manejo. La raíz tiene una característica forma cónica de color amarillo y grandes dimensiones.

Una característica distintiva es que aproximadamente dos tercios de la raíz sobresale del suelo, facilitando su arranque y cosecha. Además, es especialmente adecuada para el pastoreo directo en el campo, lo que permite a los animales acceder fácilmente al forraje.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Esta remolacha se caracteriza por su raíz cónico-ovoide, con una longitud de 25-27 cm y un peso notable. Su piel presenta un color amarillento, mientras que su pulpa es blanca.

Sembrada en primavera, se cosecha a finales de otoño-principio invierno.

Para una siembra eficiente, es aconsejable utilizar máquinas sembradoras con discos específicos para remolacha, manteniendo una distancia entre hileras de 50 cm y una profundidad de siembra de aproximadamente 0,5 cm. La preparación del suelo debe incluir un arado subsolador y una cama de siembra bien mullida. Además, se sugiere el uso de fertilizantes adecuados y un riguroso control de malezas, especialmente en las etapas iniciales de crecimiento.

CUALIDADES DESTACADAS

- Facilidad de manejo tanto en cosecha como en pastoreo.
- Alto contenido en azúcares y fibra.
- Excelente rendimiento.
- Muy apetente para el ganado.

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

- Época de siembra: marzo - mayo
- Dosis de siembra: 10 - 15 kg/ha
- Profundidad de siembra: 2 - 3 cm

